

◆登園に際して医師が記入する【登園許可証明書】の提出が必要な感染症

病名	潜伏期間	感染経路	症状	感染しやすい時期	登園のめやす
風しん	16～18日	飛沫 接触	全身に赤い小さな発疹 リンパ節の腫れ、発熱など	発疹前1週間～発疹後1週間	発疹が消えていること
麻疹 (はしか)	8～12日	飛沫 接触 空気	高熱、咳、鼻汁、目やに、 充血、口の中に白い斑点 全身に発疹など	発症1日前～ 発疹出現後の4日間	解熱後3日経過していること
水痘 (水ぼうそう)	14～16日	飛沫 接触 空気	発疹、発熱、倦怠感など 発疹は赤い発疹から水疱(水ぶくれ)に なり、乾いて黒いかさぶたになる	発疹出現1～2日前から かさぶた形成まで	全ての発疹が かさぶたになるまで
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)	16～18日	飛沫 接触	耳の下(耳下腺など)の腫れや 痛み、発熱など	発症3日前～ 耳下腺腫脹後4日	耳下腺・顎下腺・舌下腺の腫脹が 発現から5日経過し、かつ全身状態 が良好になっていること
百日咳	7～10日	飛沫 接触	風邪のような症状、長引く特有の 咳(コンコンと咳き込み、ヒューと 笛を吹くような音を立て、息を吸 い込む)	咳が出始めて 3週間を経過するまで	特有の咳が消えている または、5日間の抗菌薬治療が 終了していること
咽頭結膜熱 (プール熱)	2～14日	飛沫 接触	高熱、扁桃腺炎、結膜炎	発熱、充血などの症状 が出現した数日間	症状消失後 2日経過していること
流行性角結膜炎	2～14日	飛沫 接触	目の充血、目やになど	症状が出現した数日間	結膜炎症状が消えていること